

Fragola



Scheda di concimazione e difesa

FASE	PRODOTTO	DOSE	DISTRIBUZIONE	VANTAGGI
PREPARAZIONE DEL TERRENO	BIOTRON S	150-200 g/mq	Al Terreno, prima del trapianto.	Apporta sostanza organica ricca di estratti umici. Migliora la crescita iniziale.
DALLE PRIME FASI VEGETATIVE A COMPARSA PRIMI FRUTTI	GRANVERDE IDROSOLUBILE ORTAGGI	20 g/10 litri	Al Terreno, vicino alla pianta e poi annaffiare.	Stimola lo sviluppo e si favorisce la formazione di fragole.
INGROSSAMENTO FRAGOLE	INTEGRATORE CALCIO + GRANVERDE IDROSOLUBILE ORTAGGI	10 g/10 litri 20 g/10 litri	Sciolti in acqua e distribuiti con l'annaffiatoio. RIPETERE ogni 7-10 gg	Migliora la pezzatura, il colore, il sapore. Si previene e cura la carenza di calcio.

AVVERSITA'		PRODOTTO	DOSE*	DISTRIBUZIONE	INTERVALLO DI SICUREZZA**
VAIOLATURA ROSSA	Malattia molto diffusa. Foglia con punteggiature bianche con alone viola.	VIC 19 L FUN 9	25-30 ml/10 l acqua	Fogliare dopo il trapianto, alla ripresa vegetativa e in pre-fioritura	10 gg
OIDIO O MAL BIANCO	Comparsa di macchie clorotiche sulla pagina superiore, sulla pagina inferiore si evidenzia una patina polverulenta bianca.	ZETA 80 FUN 4	8-10 g/10 l acqua	Fogliare alla comparsa dei sintomi	5 gg
BOTRITE O MUFFA GRIGIA	Sui frutti si forma un feltro grigio dato dallo sviluppo del fungo. I frutti smettono di svilupparsi.	VIC 19 L FUN 9	25-30 ml/10 l acqua	Fogliare alla comparsa dei sintomi	10 gg
AFIDI, MOSCA	Gli insetti provocano punture trofiche e una notevole produzione di melata che imbratta i frutti.	CIFOTRIN 18 INS 11	15-20 ml/10 l acqua	Fogliare alla comparsa degli insetti	2 gg



* Consultare l'etichetta per gli specifici dosaggi.

** Giorni che devono intercorrere tra l'ultimo trattamento e il consumo dell'ortaggio.

