

Ortensia



Scheda di concimazione

FASE / PERIODO	PRODOTTO	DOSE	DISTRIBUZIONE	VANTAGGI
PREPARAZIONE DEL SUBSTRATO	BIOTRON S BLUMEN TORFY	15-30 g Terriccio quanto basta	Al momento dell'invaso o del rinvaso.	Apporta sostanza organica e migliora le caratteristiche del substrato.
DALLA RIPRESA VEGETATIVA ALLA FIORITURA	LINEA GARDEN Concime granulare per ORTENSIA	60 g /mq	Direttamente al terreno. Distribuirlo in superficie, interrarlo con zappatura e innaffiare abbondantemente.	Favorisce uno sviluppo equilibrato, aumenta la formazione dei fiori, intensificandone la colorazione e la persistenza.
IN PRESENZA DI CARENZA DI FERRO	LINEA INTEGRATORI FERRO	10 ml/10 litri acqua	Diluito in acqua e distribuito tramite nebulizzazioni fogliari.	In presenza di ingiallimenti internervali delle foglie più giovani, ridona foglie verdi e intensamente colorate.

AVVERSITA'		PRODOTTO	DISTRIBUZIONE
OIDIO o MAL BIANCO	Sulle foglie compaiono macchie rossastre che poi si ricoprono di una muffa biancastra che si diffonde su fiori e germogli.	FENICRIT	Fogliare alla comparsa dei primi sintomi, ripetere dopo 10 giorni.
MACULATURE FOGLIARI	Sulle foglie compaiono macchie brune, i tessuti colpiti disseccano e si lacerano.	FENICRIT	Fogliare alla comparsa dei primi sintomi, ripetere dopo 10 giorni.
COCCINIGLIE	Deperimento generale della pianta, presenza di insetti su foglie e germogli.	MINEROL	Da impiegare alla prima comparsa degli insetti. Ripetere successivamente ogni 7-10 giorni.
AFIDI	Le foglie si deformano e sono cosparse di una sostanza appiccicosa.. Presenza di piccoli insetti sulla pagina inferiore delle foglie.	CIPERBLOC	Fogliare alla comparsa dei primi insetti o dei sintomi, ripetere dopo 10 giorni.



Consultare l'etichetta per gli specifici dosaggi.

