

Pomodoro



Scheda di concimazione e difesa



FASE	PRODOTTO	DOSE	DISTRIBUZIONE	VANTAGGI
PREPARAZIONE DEL TERRENO	BIOTRON S	100 – 150 g/mq	Al Terreno, prima del trapianto	Apporta sostanza organica ricca di estratti umici, favorisce maggiore radicazione.
DA PRIME FASI VEGETATIVE A COMPARSA PRIMI FRUTTI	GRANVERDE MAX ORO + GRANVERDE IDROSOLUBILE ORTAGGI	18 ml/3 litri 20 g/10 litri	Diluiti in acqua e distribuiti con l'annaffiatoio al terreno, ripetere ogni 7-10 gg	Stimola lo sviluppo delle piante e la formazione di pomodori.
INGROSSAMENTO POMODORI	INTEGRATORE CALCIO + GRANVERDE IDROSOLUBILI ORTAGGI	10 g/10 litri 20 g/10 litri	Diluiti in acqua e distribuiti con l'annaffiatoio. RIPETERE ogni 7-10 gg	Migliora la pezzatura, il colore, il sapore. Maggiore consistenza. Frutti non acquosi.

AVVERSITA'	PRODOTTO	DOSE*	DISTRIBUZIONE	INTERVALLO DI SICUREZZA**
PERONOSPORA	RABOR 6 FUN 5	150 g/10 l acqua	Fogliare alla comparsa dei primi sintomi ripetere dopo 10 giorni. No in fioritura	20 gg
MARCIUMI RADICALI E DEL COLLETTO	PROMAG FUN 8	7 - 15 ml/10 l acqua	Fogliare alla comparsa dei primi sintomi ripetere dopo 14 giorni	20 gg
AFIDI, MOSCA BIANCA, CIMICE	COSMOTRIN INS 1	10 - 15 ml/10 l acqua	Fogliare alla comparsa dei primi insetti	21 gg
DORIFORA	MASTER INS 5	20 ml/10 l acqua	Fogliare alla comparsa dei primi insetti	21 gg
INSETTI E LARVE TERRICOLE	ZELIG GR INS 3	30– 40 g/10 m ²	Spargere i granuli uniformemente sul terreno intorno alle piante	21 gg



* Consultare l'etichetta per gli specifici dosaggi.

** Giorni che devono intercorrere tra l'ultimo trattamento e il consumo dell'ortaggio.

