

Viburno



Scheda di concimazione e difesa

FASE / PERIODO	APPLICAZIONI	PRODOTTO	DOSE	MOTIVAZIONE
IMPIANTO	Mescolato al terreno	BIOTRON S	150-250 g	Aumenta la fertilità del terreno e la capacità di assorbimento radicale
PRIMAVERA/ ESTATE	Al terreno	GRANVERDE Concime granulare per Prato e Giardino	30 – 70 g /mq	Favorisce la crescita e la formazione di nuovi germogli e di piante ben sviluppate
	Fogliare	FERRO	2 ml/1 litro acqua	Previene e cura il formarsi di ingiallimenti
AUTUNNO	Al terreno	GRANVERDE Concime granulare per Prato e Giardino	30 – 70 g /mq	Maggior robustezza e resistenza alle condizioni ambientali del periodo invernale

AVVERSITA'		PRODOTTO	DISTRIBUZIONE
OIDIO O MAL BIANCO	Sulle foglie compaiono macchie biancastre, polverulente che ricoprono le parti più giovani le quali avvizziscono	FENICRIT	Fogliare alla comparsa dei primi insetti ripetere dopo 10 giorni
MACULATURE FOGLIARI	Sulle lamine fogliari compaiono macchie rotondeggianti brunastre, le foglie più colpite disseccano	FENICRIT	Fogliare alla comparsa dei primi insetti ripetere dopo 10 giorni
AFIDI	Formano un manicotto attorno agli apici vegetativi e ai germogli, le piante deperiscono	CIPERBLOC	Fogliare alla comparsa dei primi insetti ripetere dopo 10 giorni
COCCINIGLIE	Ricoprono rami e foglie provocando ingiallimenti, deperimenti e disseccamenti	MINEROL	Fogliare alla comparsa dei primi insetti ripetere dopo 10 giorni

