


# Pesco



## Scheda di concimazione e difesa

FASE	PRODOTTO	DOSE	DISTRIBUZIONE	VANTAGGI
DA RIPRESA VEGETATIVA A INIZIO ACCRESCIMENTO FRUTTI	GRANVERDE ORTO E GIARDINO 20.5.10	30 – 40 g/mq	Al Terreno, vicino alla pianta e poi annaffiare. RIPETERE ogni 15-20 gg	Stimola la crescita favorendo lo sviluppo dei frutti
ACCRESCIMENTO FRUTTI E INIZIO COLORAZIONE	GRANVERDE IDROSOLUBILE ORTAGGI E PIANTE DA FRUTTO + SINERGON 2000	30 g/10 litri 20 ml/10 litri	Sciolti in acqua e distribuiti con pompa a spalla. RIPETERE ogni 8-12 gg	Si favorisce lo sviluppo iniziale dei FRUTTI e si proteggono dagli sbalzi termici
	INTEGRATORE CALCIO	10 ml/10 litri	Diluire in acqua e distribuito con pompa a spalla.	Si evita il disfacimento della polpa (mal raggiante). Si migliora il sapore e colore dei frutti. Ripetere 2-3 volte.

AVVERSITA'	PRODOTTO	DOSE*	DISTRIBUZIONE	INTERVALLO DI SICUREZZA**
BOLLA MONILIA CORINEO	VIC 19 L FUN 9	30 ml/10 l acqua	Fogliare. Ad apertura petali, fine fioritura, caduta petali.	10 gg
OIDIO	NIMROD FUN 1	5-50 ml/10 l acqua	Fogliare alla comparsa dei primi sintomi ripetere dopo 10 giorni	21 gg
AFIDI, MOSCA DELLA FRUTTA	COSMOTRIN INS 1	10 ml/ 10l acqua	Fogliare alla comparsa degli insetti PRIMAVERILI.	21 gg
ANARSIA	MASTER INS 5	16-20 ml/ 10l acqua	Fogliare alla comparsa degli insetti	30 gg



\* Consultare l'etichetta per gli specifici dosaggi.

\*\* Giorni che devono intercorrere tra l'ultimo trattamento e il consumo dell'ortaggio.

