

Calcium Fast

Linea Fast calcio a rapido assorbimento fogliare

Previene e cura le carenze di calcio.

A base di Chelato di Calcio.



Componenti: Chelato di calcio.

Modalità d'azione e vantaggi agronomici: CALCIUM FAST è un formulato liquido a base calcio in forma chelata, è caratterizzato da un'elevata capacità di assorbimento a livello fogliare, dimostrando la massima efficacia nel contrastare le fisiopatie causate dalla carenza di calcio e nell'aumentare la consistenza e la conservabilità di frutta e ortaggi.

CALCIUM FAST è indicato in particolare per risolvere rapidamente le seguenti fisiopatie:

- butteratura amara delle mele
- disseccamento del rachide della vite
- marciume apicale del pomodoro
- seccume fisiologico del melone
- seccume fogliare degli ortaggi da foglia
- mal raggiante, cracking e rugginosità delle drupacee
- necrosi marginale delle brattee della poinsettia

Analisi e proprietà chimico-fisiche:

Chelato di calcio

30%

pH 0.1%	EC 0.1% mS/cm	Densità g/ml
5.98	0.16	1.18

Taglia: 1 lt; 5 lt

Metodo di applicazione: FOGLIARE

Sulle colture orticole da frutto e frutticole iniziare i trattamenti da frutto ingrossato e proseguire sino a poco prima della raccolta.

Colture	Dose	Indicazioni
Vite e colture frutticole in genere	100-120 ml/hl	3-4 trattamenti da ingrossamento frutto
Melo varietà Golden e simili	50-60 ml/hl	4-5 trattamenti da caduta petali
Melo varietà rosse	80-120 ml/hl	4-5 trattamenti da caduta petali
Ortaggi a pieno campo	80-120 ml/hl	Dalle fasi di post allegagione ogni 10-12 giorni
Ortaggi in serra	100-120 ml/hl	Dalle fasi di post allegagione ogni 10-12 giorni
Vivai	80-100 ml/hl	Dalle prime fasi di sviluppo ogni 12-15 giorni
Piante ornamentali e da fiore	80-100 ml/hl	Dalle prime fasi di sviluppo ogni 12-15 giorni

In applicazione fogliare si consiglia di utilizzare volumi di acqua, per singola applicazione, non inferiori ai 500-600 litri/ha su colture arboree, di 150-300 lt/ha su colture industriali ed erbacee da pieno campo, e di 80-100 litri/1000 mq su colture in serra.

Fertirrigazione con manichetta: 2-3 litri /1000 mq da post-allegagione. Ripetere per 3-4 volte con intervalli di 10-15 giorni.

Dosaggi e numero di interventi sono puramente indicativi e devono essere modulati in funzione delle esigenze della coltura, della fase fenologica e delle caratteristiche pedo-climatiche.

Miscibilità: CALCIUM FAST è miscibile alla dose d'impiego con i prodotti CIFO e con gli antiparassitari in genere, in tutti i casi è buona norma controllare sulle etichette le indicazioni di compatibilità riportate.