



# Ciclamino



## Scheda di concimazione e difesa

FASE / PERIODO	PRODOTTO	DOSE	APPLICAZIONE	MOTIVAZIONE
DA INIZIO A PIENA FIORITUA	GRANVERDE PIANTE ACIDOFILE + SINERGON 2000	9 ml/1,5 litri di acqua + 1,5 ml /1,5 litri di acqua	Diluiti in acqua e distribuiti nel vaso. Ripetere ogni 8-10 gg	Favorisce la crescita e la formazione di nuovi fiori
FINE FIORITURA	GRANVERDE PIANTE ACIDOFILE + INTEGRATORE FERRO	9 ml/1,5 litri di acqua + 1,5 ml /1,5 litri di acqua	Diluiti in acqua e distribuiti nel vaso. Ripetere ogni 8-10 gg	Previene il formarsi di ingiallimenti e delle foglie e favorisce la formazione di riserve nutritive.
AVVERSITA'			PRODOTTO	DISTRIBUZIONE
OIDIO o MAL BIANCO	Su tutta la parte aerea si sviluppano macchie feltrose biancastre che allargandosi portano al disseccamento di foglie e fiori		PROPYFLOR	Fogliare alla comparsa dei primi sintomi ripetere dopo 10 giorni
MUFFA GRIGIA	Alla base dei piccioli fiorali e dei peduncoli fogliari si sviluppa una muffa grigia, sui petali compaiono macchie tonde necrotiche		FENICRIT	Fogliare alla comparsa dei primi sintomi ripetere dopo 10 giorni
TRIPIDI ACARI	Il fogliame colpito assume una colorazione rossastra e la pianta risulta deperita, i fiori possono presentare i petali deformati		CIPERBLOC	Da impiegare alla prima comparsa degli insetti e successivamente ogni 7-10 giorni. Spruzzare su entrambe i lembi delle foglie.

