

Cipolla



Scheda di concimazione e difesa

FASE	PRODOTTO	DOSE	DISTRIBUZIONE	VANTAGGI
PREPARAZIONE DEL TERRENO	BIOTRON S	100 – 150 g/mq	Al Terreno, prima del trapianto	Apporta sostanza organica ricca di estratti umici, favorisce maggiore radicazione
POST DIRADAMENTO + POST TRAPIANTO	GRANVERDE ORO + LINEA IDROSOLUBILI ORTAGGI	20 ml/10 litri 20 g/10 litri	Sciolti in acqua e distribuiti per via fogliare, ripetere dopo 10- 15 gg	Per favorire lo sviluppo nelle prime fasi vegetative
PIANTA ALTA 10-15 cm	LINEA IDROSOLUBILI ORTAGGI	20 g/10 litri	Sciolto in acqua e distribuito con l'annaffiatoio. RIPETERE ogni 7-10 gg	Favorisce lo sviluppo e l'ingrossamento del bulbo. Si migliorano le caratteristiche organolettiche

AVVERSITA'	PRODOTTO	DOSE*	DISTRIBUZIONE	INTERVALLO DI SICUREZZA**
PERONOSPORA	TRI-BASE FUN 5	30 - 40 ml/10 l acqua	Fogliare alla comparsa dei primi sintomi ripetere dopo 10 giorni.	3 gg
RUGGINE	TRI-BASE FUN 5	30 - 40 ml/10 l acqua		3 gg
AFIDI, DORIFORA, MOSCA BIANCA	COSMOTRIN INS 1	10 – 15 ml / 10 l acqua	Fogliare alla comparsa dei primi insetti.	14 gg
LARVE TERRICOLE	ZELIG GR	30 - 40 g /10 m²	Spargere i granuli uniformemente sul terreno intorno alle piante	21 gg



* Consultare l'etichetta per gli specifici dosaggi.

** Giorni che devono intercorrere tra l'ultimo trattamento e il consumo dell'ortaggio.

