

Fagiolo/Fagiolino





Specialista
cifo



cifo
dal 1965

Scheda di concimazione



FASE	PRODOTTO	DOSE	DISTRIBUZIONE	VANTAGGI
PREPARAZIONE DEL TERRENO	BIOTRON S	150 g/mq	Al Terreno, prima del trapianto.	Apporta sostanza organica ricca di estratti umici. Migliora la crescita iniziale, meno stress, maggiore radicazione.
PRIME FASI VEGETATIVE A INGROSSAMENTO FAGIOLINI	SINERGON 2000 + GRANVERDE IDROSOLUBILE ORTAGGI	20g/10 litri 20g/10 litri	Sciolti in acqua e distribuiti con l'annaffiatoio, ripetere ogni 87-10 gg	Si fornisce nutrimento, si stimola l'accrescimento delle piante e la produzione di fagiolini.

AVVERSITA'		PRODOTTO	DOSE*	DISTRIBUZIONE	Intervallo di Sicurezza
Oidio	Comparsa di macchie clorotiche sulla pagina superiore e inferiore delle foglie dove si evidenzia una patina polverulenta.	ZETA 80 FUN 4	10g/10 l acqua	Fogliare alla comparsa dei primi sintomi ripetere dopo 10 giorni	5 gg
Cimice, Dorifora, Afidi, Mosca Bianca	Il danno sulle foglie e sui frutti è causato dalle punture di nutrizione di tutte le forme mobili di questi insetti.	COSMOTRIN INS 1	10-15 ml/10 l acqua	Fogliare alla comparsa dei primi insetti	21 gg
Larve Terricole (Nottue; Grillotalpa)	Il danno si manifesta sulle radici ma soprattutto sui baccelli dove la larva scava gallerie nella polpa.	ZELIG GR	30-40 g/ 10 m ²	Spargere i granuli uniformemente sul terreno intorno alle piante	15 gg

