

Gelsomino






Scheda di concimazione e difesa



FASE / PERIODO	PRODOTTO	DOSE	APPLICAZIONE	MOTIVAZIONE
DA RIPRESA VEGETATIVA A PIENA FIORITURA	ASSO DI FIORI	9 g/5 litri di acqua	Sciolto in acqua e distribuito al terreno. Ripetere ogni 8 – 10 gg	Favorisce la crescita e la formazione di nuovi fiori
IN PRESENZA DI PIANTE STENTATE	SINERGON 2000	9 ml/10 litri di acqua	Diluito in acqua e distribuito al terreno. Ripetere ogni 8 – 10 giorni	Grazie al contenuto di aminoacidi ed elementi nutritivi favorisce la crescita di piante stentate

AVVERSITA'		PRODOTTO	DISTRIBUZIONE
COCCINIGLIE	Chiazze bianche lanuginose sulle foglie e sui gambi. La presenza degli insetti porta al deperimento della pianta	MAVRICK CASA GIARDINO	Fogliare alla comparsa dei primi insetti, ripetere dopo 10 giorni. Dose: 3 ml/10 litri acqua
AFIDI MOSCA BIANCA	Presenza di foglie contorte e appiccicose con insetti verdi (afidi). Presenza di moschine bianche sulla pianta	SUSCON	Direttamente al terreno, dose in funzione del diametro dei vasi.
RAGNETTO ROSSO	Foglie pallide con ragnatele sulla pagina inferiore	MAVRIK CASA GIARDINO	Fogliare alla comparsa dei primi sintomi ripetere dopo 10 giorni

