

Glicine



Scheda di concimazione e difesa

FASE	PRODOTTO	DOSE	APPLICAZIONE	MOTIVAZIONE
DA RIPRESA VEGETATIVA A PIENA FIORITURA	ASSO DI FIORI	9 g/5 litri di acqua	Sciolto in acqua e distribuito al terreno. Ripetere ogni 8-10 gg	Favorisce la crescita e la formazione di nuovi fiori
IN PRESENZA DI PIANTE STENTATE	SINERGON 2000	9 ml/10 litri di acqua	Diluito in acqua e distribuito al terreno. Ripetere ogni 8-10 gg	Grazie al contenuto di aminoacidi ed elementi nutritivi favorisce la crescita di piante stentate.
AVVERSITA'			PRODOTTO	DISTRIBUZIONE
MACULATURE FOGLIARI	Sulle foglie compaiono macchie brune di varia forma, le foglie più colpite disseccano		FENICRIT	Fogliare alla comparsa dei primi sintomi ripetere dopo 10 giorni
MAL BIANCO / OIDIO	Sulla parte aerea si sviluppa una muffa biancastra		PROPYFLOR	Fogliare alla comparsa dei primi sintomi ripetere dopo 10 giorni
RAGNETTO ROSSO	Le foglie adulte assumono un tipico aspetto "bruciacciato", sulla pagina inferiore delle foglie presenza di filamenti ragnatelosi		MAVRIK CASA GIARDINO	Fogliare alla comparsa dei primi insetti ripetere dopo 10 giorni
COCCINIGLIE	La presenza degli insetti su foglie e rametti porta al deperimento generale della pianta ed alla formazione di fumaggine		MAVRIK CASA GIARDINO	Fogliare alla comparsa dei primi insetti ripetere dopo 10 giorni

