

Melo



Scheda di concimazione e difesa

FASE	PRODOTTO	DOSE	DISTRIBUZIONE	VANTAGGI
DA RIPRESA VEGETATIVA A COMPARSA PRIMI FRUTTI	GRANVERDE LENTA CESSIONE ORTO	80 – 100 g/pianta	Al terreno, nell'area della proiezione della chiome	Stimola la crescita favorendo lo sviluppo iniziale dei FRUTTI
ACCRECIMENTO FRUTTI E INIZIO COLORAZIONE	Linea idrosolubili ORTAGGI E PIANTE DA FRUTTO + Linea Integratori CALCIO	30g/10 litri acqua + 10 ml/10 litri acqua	Sciolti in acqua e distribuiti per via fogliare. Ripetere ogni 10 – 15 giorni	SI EVITA LA BUTTERATURA DELLA POLPA. Si aumenta il grado zuccherino e il colore dei frutti. Ripetere 2 – 3 volte
AVVERSITA'	PRODOTTO	DOSE*	DISTRIBUZIONE	INTERVALLO DI SICUREZZA**
TICCHOLIATURA	CYPRUS 25 DF FUN 2	15 g/10 l acqua	Fogliare alla ripresa vegetativa, prima della fioritura	20 gg
OIDIO	NIMROD FUN 1	3 – 6 ml/10 l acqua	Fogliare alla comparsa dei primi sintomi ripetere dopo 10 giorni	21 gg
Microlepidotteri RICAMATORI	OLEOTER ESTATE INS 7	200 ml/10 l acqua	Fogliare alla comparsa dei primi insetti ripetere dopo 10 giorni	20 gg
CARPOCAPSA	MASTER INS 5	16 - 20 ml/ 10 l acqua	Fogliare alla comparsa dei primi insetti	30 gg



* Consultare l'etichetta per gli specifici dosaggi.

** Giorni che devono intercorrere tra l'ultimo trattamento e il consumo dei frutti.

