



Scheda di concimazione e difesa

FASE	PRODOTTO	DOSE	DISTRIBUZIONE	VANTAGGI
PERIODO AUTUNNO-INVERNALE	BIOTRON S	350 – 400 g/mq	Al Terreno, nell'area della proiezione della chioma	Apporta sostanza organica ricca di estratti umici. Migliora la radicazione e la ripresa vegetativa.
DA RIPRESA VEGETATIVA A COMPARSA FRUTTI – INIZIO COLORAZIONE	LINEA IDROSOLUBILI ORTAGGI E PIANTE DA FRUTTO + SINERGON 2000	30 g/10 litri + 20 ml/10 litri	Sciolti in acqua e distribuiti con pompa a spalla.	Si favorisce lo sviluppo iniziale delle olive e si proteggono i fiori dagli sbalzi termici. Si aumenta la formazione di sostanze oleose della polpa e il colore delle olive.

AVVERSITA'	PRODOTTO	DOSE*	DISTRIBUZIONE	INTERVALLO DI SICUREZZA**
LEBBRA	CYPRUS 25 DF FUN 2	22 g/10 l acqua	Fogliare alla comparsa dei primi sintomi ripetere dopo 10 giorni	20 gg
OCCHIO DI PAVONE	TRI-BASE FUN 5	5 - 6 ml/1 l acqua	Fogliare in autunno, in pre-fioritura e in vegetazione	20 gg
COCCINIGLIE	OLETOTER ESTATE INS 10	5 - 20 ml/ 1 l acqua	Trattamenti di fine inverno	20 gg



* Consultare l'etichetta per gli specifici dosaggi.

** Giorni che devono intercorrere tra l'ultimo trattamento e il consumo dell'ortaggio.