

Rosa





Scheda di
concimazione



FASE / PERIODO	PRODOTTO	DOSE	DISTRIBUZIONE	VANTAGGI
PREPARZIONE DEL SUBSTRATO	BIOTRON S BLUMEN TORFY	15 - 30 g Terriccio quanto basta	Al momento trapianto o del rinvaso.	Apporta sostanza organica e migliora le caratteristiche del substrato.
DALLA RIPRESA VEGETATIVA ALLA FIORITURA	LINEA GARDEN Concime granulare per ROSE	60 g /mq	Direttamente al terreno. Distribuirlo in superficie, interrarlo con zappatura e innaffiare abbondantemente.	Favorisce uno sviluppo equilibrato, aumenta la formazione dei fiori, intensificandone la colorazione e la persistenza.
CARENZA DI MAGNESIO	LINEA INTEGRATORI MAGNESIO	10 ml/10 litri acqua	Diluito in acqua e distribuito tramite nebulizzazioni fogliari.	In presenza di caduta precoce delle foglie basali riequilibra le funzioni vegetative della pianta.
IN PRESENZA DI CARENZA DI FERRO	LINEA INTEGRATORI FERRO	10 ml/10 litri acqua	Diluito in acqua e distribuito tramite nebulizzazioni fogliari.	In presenza di ingiallimenti internodiali delle foglie più giovani, ridona foglie verdi e intensamente colorate.

AVVERSITA'		PRODOTTO	DISTRIBUZIONE
OIDIO o MAL BIANCO	Sulle foglie compaiono macchie rossastre che poi si ricoprono di una muffa biancastra che si diffonde su fiori e germogli.	PROPYFLOR	Fogliare alla comparsa dei primi sintomi, ripetere dopo 10 giorni.
MACULATURE FOGLIARI	Sulle foglie compaiono macchie tondeggianti scure, i tessuti colpiti disseccano e si lacerano.	FENICRIT	Fogliare alla comparsa dei primi sintomi, ripetere dopo 10 giorni.
RAGNETTO	Ingiallimenti fogliari, presenza degli insetti e ragnatele sulla pagina inferiore delle foglie. Macchie rossastre in corrispondenza delle punture degli insetti.	MAVRIK CASA GIARDINO	Da impiegare alla prima comparsa dei sintomi o degli insetti. Ripetere successivamente ogni 7-10 giorni.
AFIDI	Le foglie si deformano e sono cosparse di una sostanza appiccicosa. Presenza di piccoli insetti verdi sul fusto, sul bocciolo e sulla pagina inferiore delle foglie.	CIPERBLOC	Fogliare alla comparsa dei primi insetti o dei sintomi, ripetere dopo 10 giorni.



Consultare l'etichetta per gli specifici dosaggi.