

Stella di Natale



Scheda di concimazione

FASE / PERIODO	PRODOTTO	DOSE	DISTRIBUZIONE	VANTAGGI
PREPARAZIONE DEL SUBSTRATO	BIOTRON S BLUMEN TORFY	15-30 g Terriccio quanto basta	Al momento dell'invaso o del rinvaso	Apporta sostanza organica e migliora le caratteristiche del substrato.
DALLA RIPRESA VEGETATIVA ALLA FIORITURA	GRANVERDE Concime liquido per PIANTE FIORITE	18-20 ml/ 3 litri acqua	Diluito in acqua distribuito tramite nebulizzazioni fogliari o direttamente al terreno . Ripetere ogni 10 -15 gg	Favorisce uno sviluppo equilibrato, aumenta la formazione dei fiori, intensificandone la colorazione e la persistenza.
IN SITUAZIONI DI STRESS	SINERGON 2000	9-10 ml/ 10 litri acqua	Diluito in acqua e distribuito tramite nebulizzazioni fogliari o direttamente al terreno .	In presenza di correnti di aria fredda che fanno ingiallire le foglie e le fanno cadere.

AVVERSITA'		PRODOTTO	DISTRIBUZIONE
OIDIO o MAL BIANCO	Su tutta la parte aerea si sviluppa una muffa biancastra che produce avvizzimenti delle zone colpite	PROPYFLOR	Fogliare alla comparsa dei primi sintomi, ripetere dopo 10 giorni
MARCIUMI RADICALI	Comparsa di imbrunimenti nella parte basale del fusto, le foglie ingialliscono e cadono.	PROMAG FUN 8	Da impiegare alla prima comparsa dei sintomi o preventivamente. Ripetere successivamente ogni 7-10 giorni.
COCCINIGLIE	Presenza di piccoli insetti lungo i piccioli e i peduncoli fogliari. La pianta si presenta stentata e ingiallita.	MAVRICK CASA GIARDINO	Fogliare alla comparsa dei primi insetti, ripetere dopo 10 giorni.
AFIDI o MOSCA BIANCA	Presenza di piccoli insetti sulla pagina inferiore delle foglie. Appassimento degli apici vegetativi, le foglie si accartocciano e disseccano.	CIPERBLOC	Fogliare alla comparsa dei primi insetti o dei sintomi, ripetere dopo 10 giorni.



Consultare l'etichetta per gli specifici dosaggi.

