


SUSINO



Scheda di concimazione e difesa

FASE	PRODOTTO	DOSE	DISTRIBUZIONE	VANTAGGI
da RIPRESA VEGETATIVA a INIZIO ACCRESCIMENTO FRUTTI	GRANVERDE LENTA CESSIONE PER ORTO	80 - 100 g/pianta	Al Terreno, nell'area della proiezione della chioma e poi annaffiare.	Si favorisce lo sviluppo iniziale del FRUTTI e si proteggono dagli sbalzi termici.
ACCRESCIMENTO FRUTTI E INIZIO COLORAZIONE	GRANVERDE IDROSOLUBILI ORTAGGI + INTEGRATORE CALCIO	30 g/10 litri 10 ml/10 litri	Sciolti in acqua e distribuiti con pompa a spalla. Ripetere ogni 10-15 gg	Si migliorano le caratteristiche qualitative e il colore dei frutti. Si aumenta il SAPORE.

AVVERSITA'	PRODOTTO	DOSE*	DISTRIBUZIONE	INTERVALLO DI SICUREZZA**
OIDIO	ZETA 80 FUN 4	1 g/1 lt acqua	Fogliare alla comparsa dei primi sintomi ripetere dopo 10 giorni	5 gg
RAGNETTO ROSSO	ACARISTOP	0,75 ml/ 1lt acqua	Fogliare all'inizio dell'infestazione	30 gg
COCCINIGLIE	OLEOTER ESTATE INS 10	5 - 20 ml/ 1lt acqua	Trattamenti fogliari in presenza degli insetti con la pianta in vegetazione	20 gg



* Consultare l'etichetta per gli specifici dosaggi.

** Giorni che devono intercorrere tra l'ultimo trattamento e il consumo dell'ortaggio.

