

# Vite da vino



## Scheda di concimazione e difesa

FASE	PRODOTTO	DOSE	DISTRIBUZIONE	VANTAGGI
PERIODO AUTUNNO-INVERNALE	BIOTRON S	250 – 300 g/mq	Al Terreno, nell'area della proiezione della chioma	Apporta sostanza organica ricca di estratti umici. Migliora la radicazione e la ripresa vegetativa
DA RIPRESA VEGETATIVA A INGROSSAMENTO ACINO	LINEA IDROSOLUBILI ORTAGGI E PIANTE DA FRUTTO + SINERGON 2000	30 g/10 litri 10 ml/10 litri	Al terreno, vicino alla pianta e poi annaffiare.	Stimola la crescita, si fornisce nutrimento e si favorisce l'allungamento del grappolo e l'accrescimento degli acini.
	INTEGRATORE MAGNESIO	10 ml/10 litri	Diluito in acqua e distribuito con pompa a spalla. Ripetere ogni 7-10 gg	Si evita il disseccamento del rachide. Si aumenta il grado zuccherino e il colore.

AVVERSITA'	PRODOTTO	DOSE*	DISTRIBUZIONE	INTERVALLO DI SICUREZZA**
PERONOSPORA	TRI-BASE FUN 5	30 ml/10 l acqua	Fogliare dalla formazione acini ogni 7-10 gg	20 gg
OIDIO	ZETA 80 FUN 4	10 g/10 l acqua	Fogliare alla comparsa dei primi sintomi (dopo l'allegagione) ripetere dopo 10 giorni	5 gg
TIGNOLA SIGARAI	COSMOTRIN INS 1	10 ml/ 10l acqua	Fogliare alla comparsa dei primi sintomi	28 gg
TRIPIDI	MASTER INS 5	16-21 ml/ 10l acqua	Fogliare alla comparsa dei primi insetti	30 gg



\* Consultare l'etichetta per gli specifici dosaggi.

\*\* Giorni che devono intercorrere tra l'ultimo trattamento e il consumo del frutto.

