

PIRETRO VERDE PFnPE**Insetticida liquido concentrato emulsionabile a base di Piretro naturale****PIRETRO VERDE PFnPE – Composizione**

100 g di prodotto contengono:

| | |
|----------------|-----------------------------|
| Piretrine pure | 2,00 g/ 100 g (= 18,61 g/l) |
| Coformulanti | q.b. a g 100 |

**ATTENZIONE****Indicazioni di Pericolo:**

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Consigli di Prudenza:

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

P273 Non disperdere nell'ambiente.

P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.

P501 Smaltire il recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

Reg. N° 8558 del 3.12.94 del Ministero della Sanità*Prodotto Fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali con validità fino al 2 Novembre 2021***Titolare registrazione:****COPYR S.p.A.** – Via G. Stephenson, 73 – 20157 Milano Tel. 02/3903681**Officine di produzione:****MI** Althaller Italia S.r.l. – S. Colombano al Lambro (MI)**BG1** IRCA Service S.p.A. – Forno S. Giovanni (BG)**BG2** Diachem S.p.A. – Unità prod. Sifa – Caravaggio (BG)

Contenuto netto: ml 1.5 – 10 – 15 – 20 – 25 – 50 – 75 – 100 – 200 – 250 – 500;

Partita N. del:

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

AVVERTENZE

Attenzione manipolare con prudenza.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO**Consultare un Centro Antiveleni.****CARATTERISTICHE**

PIRETRO VERDE è un insetticida a base di solo Piretro naturale in supporto liquido di origine vegetale e può essere impiegato su moltissime colture agrarie in qualsiasi stagione.

PIRETRO VERDE è un insetticida di contatto che agisce rapidamente contro diversi parassiti delle orticole, frutticole e floricole.

PIRETRO VERDE è compatibile con fertilizzanti fogliari. Non è miscelabile con la poltiglia bordolese.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

PIRETRO VERDE va impiegato diluito in acqua. I trattamenti vanno effettuati alla prima comparsa dei parassiti, possibilmente la sera e comunque nelle ore più fresche della giornata.

Le seguenti dosi sono riferite a ettolitro d'acqua.

AGRUMI (arancio, limone, mandarino) – contro Afidi, Mosca Bianca (Aleurodidi): ml 140-160. **DRUPACEE** (pesche, prugne, ciliegie, albicocche) – contro Afidi (*Myzus persicae*), *Drosophila suzukii*: ml 140-160. **VITE** (uva da vino e uva da tavola) - contro Tignola (*Clysia ambiguella*), Tignoletta (*Lobesia botrana*), Cicaline (*Scaphoideus titanus*, *Empoasca vitis*): ml 140-160. **FRAGOLA** – contro Tripidi, *Drosophila suzukii*: ml 140-160. **PICCOLI FRUTTI** (lampone, mirtillo, mora, ribes) – contro *Drosophila suzukii*: ml 140-160. **ORTAGGI A FOGLIA, ERBE FRESCHE E FIORI COMMESTIBILI*** - contro Afidi: ml 140-160.

POMODORO, PEPERONE, MELANZANA – contro Mosca Bianca (Aleurodidi), Tripidi: ml 140-160. **CUCURBITACEE** (Zucchini e Melone) – contro Afidi: ml 140-160. **FLOREALI E ORNAMENTALI** (in pieno campo) – contro Afidi, Tripidi, Mosca bianca (Aleurodidi): ml 140-160.

*Lattughe e insalate (Dolcetta/valerianella/gallinella, Lattughe, Scarola/indivia a foglie larghe, Crescione e altri germogli e gemme, Barbarea, Rucola, Senape juncea, Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee), Foglie di spinaci e simili (Spinaci, Portulaca/porcellana, Bietole da foglia e da costa), Foglie di vite e specie simili, Crescione acquatico, Cicoria Witloof/cicoria belga, Erbe fresche e fiori commestibili (Cerfoglio, Erba cipollina, Foglie di sedano, Prezzemolo, Salvia, Rosmarino, Timo, Basilico e fiori commestibili, Foglie di alloro/lauro, Dragoncello, Altri)

Utilizzare volumi d'acqua e pressioni adeguate per ottenere una buona copertura della coltura. Curare in modo particolare la pagina inferiore delle foglie nel caso di Aleurodidi (Mosca Bianca) e Tripidi.

Sospendere i trattamenti:

- **1 giorno prima del raccolto per Agrumi, Vite, Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili, Pomodoro, Peperone, Melanzana, Cucurbitacee**
- **2 giorni prima del raccolto per Fragola e Piccoli Frutti**
- **7 giorni prima del raccolto per Drupacee**

ATTENZIONE

DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI. DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI. OPERARE IN ASSENZA DI VENTO. DA NON VENDERSI SFUSO. IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

V4