

Cetriolo



Scheda di concimazione e difesa

FASE	PRODOTTO	DOSE	DISTRIBUZIONE	VANTAGGI
PREPARAZIONE DEL TERRENO	BIOTRON S	100 – 150 g/mq	Al Terreno, prima del trapianto	Apporta sostanza organica ricca di estrattivi umici, favorisce maggiore radicazione
FASI INIZIALI DI SVILUPPO FINO A FRUTTI ALLEGATI	GRANVERDE CONCIME GRANULARE PER ORTO	50 – 60 g/m ²	Al terreno	Per favorire lo sviluppo nelle prime fasi vegetative
DA INGROSSAMENTO FRUTTO A RACCOLTA	GRANVERDE ORO + Linea Idrosolubili concime per ORTAGGI	20 ml/10 litri 20 g/10 litri	Sciolti in acqua e distribuiti per via fogliare, ripetere ogni 10- 15 gg	Favorisce lo sviluppo e l'ingrossamento del frutto. Si migliorano le caratteristiche organolettiche

AVVERSITA'	PRODOTTO	DOSE*	DISTRIBUZIONE	INTERVALLO DI SICUREZZA**
MAL BIANCO (OIDIO)	NIMROD FUN 1	1 ml/1 l acqua	Fogliare alla comparsa dei primi sintomi ripetere dopo 10 giorni	3 gg
MARCIUMI PEDALI/RADICALI	PROMAG FUN 8	1,5 - 3 ml in 2 litri acqua ogni 10 mq	Fogliare alla comparsa dei primi sintomi	20 gg
PERONOSPORA, ANTRACNOSI	CYPRUS 25 DF FUN 2	1,6 – 2,1 ml / 1 l acqua	Fogliare, interventi preventivi	3 gg



* Consultare l'etichetta per gli specifici dosaggi.

** Giorni che devono intercorrere tra l'ultimo trattamento e il consumo dell'ortaggio.

