

# Fragola



## Scheda di concimazione e difesa

FASE	PRODOTTO	DOSE	DISTRIBUZIONE	VANTAGGI
PREPARAZIONE DEL TERRENO	BIOTRON S	150-200 g/mq	Al Terreno, prima del trapianto.	Apporta sostanza organica ricca di estratti umici. Migliora la crescita iniziale.
DALLE PRIME FASI VEGETATIVE A COMPARSA PRIMI FRUTTI	GRANVERDE IDROSOLUBILE ORTAGGI	20 g/10 litri	Al Terreno, vicino alla pianta e poi annaffiare.	Stimola lo sviluppo e si favorisce la formazione di fragole.
INGROSSAMENTO FRAGOLE	INTEGRATORE CALCIO + GRANVERDE IDROSOLUBILE ORTAGGI	10 g/10 litri 20 g/10 litri	Sciolti in acqua e distribuiti con l'annaffiatoio. RIPETERE ogni 7-10 gg	Migliora la pezzatura, il colore, il sapore. Si previene e cura la carenza di calcio.

AVVERSITA'	PRODOTTO	DOSE*	DISTRIBUZIONE	INTERVALLO DI SICUREZZA**
VAIOLATURA ROSSA	CYPRUS 25 DF FUN 2	1,6 - 2 g/1 l acqua	Fogliare dopo il trapianto, alla ripresa vegetativa e in pre-fioritura	3 gg
OIDIO O MAL BIANCO	ZETA 80 FUN 4	0,8-1 g/1 l acqua	Fogliare alla comparsa dei sintomi	5 gg
ACARI	ACARISTOP INS 7	1 ml/1 l acqua	Fogliare nelle prime fasi vegetative	3 gg



\* Consultare l'etichetta per gli specifici dosaggi.

\*\* Giorni che devono intercorrere tra l'ultimo trattamento e il consumo dell'ortaggio.

