



Scheda di concimazione e difesa

FASE	PRODOTTO	DOSE	DISTRIBUZIONE	VANTAGGI
PERIODO AUTUNNO-INVERNALE	BIOTRON S	350 – 500 g/mq	Al Terreno, nell'area della proiezione della chioma	Apporta sostanza organica ricca di estratti umici. Migliora la radicazione e la ripresa vegetativa
DA RIPRESA VEGETATIVA A COMPARSA PRIMI FRUTTI	GRANVERDE ORTO E GIARDINO 20.5.10	30 – 40 g/mq	Al Terreno, vicino alla pianta e poi annaffiare. RIPETERE ogni 15-20 gg	Stimola la crescita favorendo lo sviluppo dei frutti
ACCRESCIMENTO FRUTTI E INIZIO COLORAZIONE	LINEA IDROSOLUBILI ORTAGGI E PIANTE DA FRUTTO + SINERGON 2000	30 g/10 litri 20 ml/10 litri	Sciolti in acqua e distribuiti con pompa a spalla. Ripetere ogni 10-15 gg	Si fornisce nutrimento per favorire lo sviluppo di frutti grossi e gustosi. Si aumenta il grado zuccherino e il colore dei frutti. Ripetere 2-3 volte.

AVVERSITA'	PRODOTTO	DOSE*	DISTRIBUZIONE	INTERVALLO DI SICUREZZA**
TICCHIOLATURA	CYPRUS 25 DF FUN 2	20-21 g/10 l acqua	Fogliare alla ripresa vegetativa, prima della fioritura	20 gg
OIDIO	ZETA 80 FUN 4	10 g/10 l acqua	Fogliare alla comparsa dei primi sintomi ripetere dopo 10 giorni	5 gg
AFIDI, PSILLA E CARPOCAPSA, Microlepidotteri MINATORI	COSMOTRIN INS 1	10 -15 ml/10 l acqua	Fogliare alla comparsa dei primi sintomi ripetere dopo 10 giorni	21 gg
COCCINIGLIE	OLEOTER ESTATE INS 10	50-200 ml/ 10 l acqua	Trattamenti di fine inverno	20 gg



* Consultare l'etichetta per gli specifici dosaggi.

** Giorni che devono intercorrere tra l'ultimo trattamento e il consumo del frutto.